



СПЕЦИФІКА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ II ТИПУ

Кондратенко Анастасія Павлівна

**Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології
та соціальної роботи**

Харківський національний медичний університет



Цукровий діабет - найбільш поширене ендокринне захворювання, яке обумовлено абсолютною або відносною недостатністю інсуліну і характеризується цілим комплексом соматичних, неврологічних і психічних порушень.

Мета дослідження: визначити клініко-психопатологічні особливості хворих на цукровий діабет II типу




ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ДІАБЕТ
ЗРОСТАЄ



422 мільйони
дорослих хворіють
на діабет у світі

1,2 мільйони
хворих
на діабет в Україні


РОЗПОДІЛ ХВОРИХ ЗА ПОКАЗНИКАМИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЗА МЕТОДИКОЮ MMSE (%)



- легкі когнітивні порушення
- помірні когнітивні порушення




ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЗА МЕТОДИКОЮ MMSE (M±M)






Показники за шкалою Гамільтона (%)

Тривога



- немає проявів тривоги
- легка тривога

Депресія



- немає проявів депресії
- легкий депресивний розлад
- помірний депресивний розлад

Діабет -
це не
вирок



ВИСНОВКИ

- ✓ У обстежених хворих з цукровим діабетом відмічаються легкі та помірні когнітивні порушення.
- ✓ Когнітивні порушення проявляються зниженням обсягів вербальної пам'яті, зниженням швидкості лічильних операцій, незначним утрудненням орієнтації та зниженням показників перцептивно-гностичної сфери, зниженням концентрації уваги та запам'ятовування отриманої інформації.
- ✓ Для обстежених хворих притаманні високий рівень емоційної напруги, афект тривоги, порушення циклу сон-неспанння, загальна слабкість, млявість, відчуття напруження.

